

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Tugurejo Semarang pada bulan September - November 2016 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Karakteristik hematologi yang menunjukkan adanya perbedaan secara bermakna pada pasien preeklampsia dengan kehamilan normotensi adalah kadar hematokrit, jumlah leukosit, dan jumlah trombosit sehingga perlu dilakukan pemantauan lebih cermat pada kasus preeklampsia sebagai faktor prediktor terjadinya komplikasi preeklampsia seperti, BBLR (IUGR dan persalinan prematur) dan asfiksia neonatorum.
2. Karakteristik hematologi yang tidak menunjukkan perbedaan secara bermakna pada pasien preeklampsia dengan kehamilan normotensi adalah jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, kadar MCV, MCH, dan MCHC.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan supaya memahami faktor prediktor terjadinya komplikasi preeklampsia berdasarkan profil hematologi dengan menyarankan pemeriksaan darah rutin selama masa kehamilan, khususnya pada trimester ke-3.
2. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat mengembangkan penelitian dengan metode yang lebih baik yaitu kohort dan dilakukan sejak trimester pertama sehingga dapat memantau perubahan hematologi sejak dini apakah cenderung naik atau turun.