

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kejadian leukositosis pada ibu nifas di RSUD Tugurejo Semarang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Umur responden yang mengalami leukositosis terbanyak pada usia tidak beresiko (20-35 tahun) sebanyak 20 orang (58,8%). Status paritas responden dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar responden yang mengalami leukositosis yaitu ibu dengan status multipara yaitu sebanyak 44 orang (46,3%).
2. Status gizi responden yang mengalami status gizi KEK yaitu sebanyak 28 orang (58,3%).
3. Proses inflamasi pada responden didapatkan sebagian besar terjadi inflamasi yaitu sebanyak 47 orang (48,5%).
4. Status anemia pada responden didapatkan bahwa yang mengalami anemia yaitu sebanyak 26 orang (61,9%).
5. Jenis persalinan pada responden didapatkan sebagian besar menjalani persalinan perabdominal yaitu sebanyak 37 orang (55,2%).
6. Kejadian leukositosis pada responden didapatkan bahwa yang mengalami leukositosis sebanyak 58 orang (48,3%).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti ingin memberikan saran bagi:

1. Instansi RSUD Tugurejo Semarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kejadian leukositosis pada ibu nifas sehingga Rumah Sakit dapat meningkatkan pelayanan pada ibu nifas, yaitu dengan menentukan standard prosedur operasional tentang tatalaksana pencegahan infeksi,

yang menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kematian maternal akibat infeksi.

2. Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan melakukan perawatan pada luka pasca melahirkan untuk menghindari penyebab tingginya kadar leukosit berdasarkan risiko persalinan dan nifas.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengenali lebih dini tentang tanda-tanda infeksi, dan melakukan pencegahan infeksi setelah melahirkan.

4. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk penelitian yang akan datang dapat melakukan penelitian dengan meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi leukositosis pada pasien ibu nifas misalnya metode perawatan luka pasca persalinan dan jenis persalinan.

