

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR RISIKO TERJADINYA PREEKLAMISIA BERAT DI RSUD TUGUREJO TAHUN 2011

Fajar Alfa Muflihan, <sup>1)</sup> M Sudiat, <sup>2)</sup> Rochman Basuki <sup>3)</sup>

## ABSTRAK

**Latar Belakang :** Penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin terkait kehamilan adalah preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia dibedakan menjadi dua yaitu preeklamsia ringan dan berat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor risiko yaitu usia, paritas dan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia berat di RSUD Tugurejo Semarang.

**Metode :** Penelitian ini merupakan studi observasional dengan desain *cross sectional* yang dianalisis dengan uji statistik dengan tingkat kemaknaan 95% yang meliputi analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat terhadap variabel usia, paritas dan riwayat hipertensi terhadap kejadian preeklamsia berat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 53 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling.

**Hasil :** Hasil analisis bivariat dari 53 ibu hamil, variabel usia ( $p = 0,663$ ) dan variabel paritas ( $p = 0,854$ ) menunjukkan bahwa variabel usia dan paritas tidak terdapat hubungan dengan kejadian preeklamsia berat. Sedangkan variabel riwayat hipertensi ( $p = 0,007$ ) menunjukkan bahwa ada hubungan dengan kejadian preeklamsia berat.

**Simpulan :** Ada hubungan antara riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia berat dan tidak ada hubungan antara usia dan paritas dengan kejadian preeklamsia berat.

**Kata kunci :** Preeklamsia Berat, Faktor Risiko

---

<sup>1)</sup> Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang

<sup>3)</sup> Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang

