

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian kadar hemoglobin sebelum dan sesudah *sectio caesarea* terhadap 28 pasien yang dilakukan di RSUD Purwodadi menyimpulkan :

1. Kadar hemoglobin sebelum *sectio caesarea* yang di bawah 11,0 g/dL sebesar 28,57 % (8 pasien), sedangkan yang di atas 11,0 g/dL sebesar 71,43% (20 pasien).
2. Kadar hemoglobin sesudah *sectio caesarea* yang di bawah 11,0 g/dL sebesar 64,29 % (18 pasien), sedangkan yang di atas 11,0 g/dL sebesar 35,71 % (10 pasien).

5.2 Saran

1. Berdasar penelitian ini penulis menyarankan bagi tenaga ATLM dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kadar hemoglobin sebelum dan sesudah *sectio caesarea* karena terkait dengan tindakan yang akan diberikan, antara lain referensi bagi rumah sakit untuk mempersiapkan transfusi darah.
2. Penelitian dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya dengan memperhitungkan faktor-faktor yang berpengaruh antara lain umur dan indikasi *sectio caesarea*.