

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Status gizi balita berdasar Berat Badan menurut Umur (BB/U) sebelum pemberian MP-ASI biskuit dengan z-score rerata $-2,93 \pm 0,73$ SD, kategori gizi buruk sebesar 7 anak (43,8%), gizi kurang 7 anak (43,8%) dan gizi baik 2 anak (12,5%).
2. Status gizi balita berdasar Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sebelum pemberian MP-ASI biskuit z-score rerata $-2,69 \pm 0,46$ SD, kategori sangat kurus 4 anak (25%) dan kurus 12 anak (75%).
3. Status gizi balita berdasar BB/U sesudah pemberian MP-ASI biskuit dengan z-score rerata $-2,59 \pm 0,93$ SD, kategori gizi buruk 6 anak (37,5%), gizi kurang sebesar 4 anak (25%) dan gizi baik terdapat 6 anak (37,5%).
4. Status gizi balita berdasar BB/TB sesudah pemberian MP-ASI biskuit z-score rerata $-1,78 \pm 0,92$ SD, kategori kurus 8 anak (50%) dan normal 8 anak (50%).
5. MP-ASI biskuit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan status gizi balita berdasar BB/U.
6. MP-ASI biskuit memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan status gizi balita berdasar BB/TB.

5.2 Saran

Pengaruh MP-ASI biskuit terhadap peningkatan status gizi balita berdasar BB/U dan BB/TB(PB) memiliki makna signifikan, maka perlu diberikan secara kontinyu selama 3 bulan (90 hari) dan pemantauan secara berkala.