

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BBLR dengan derajat BBLR (Berat badan lahir 1500 – 2500 gram) merupakan yang terbanyak di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan jumlah 107 dengan prosentase 85,6%.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asfiksia neonatorum dengan tingkat keparahan sedang merupakan yang terbanyak di RSUD Kabupaten Karanganyar dengan jumlah 104 dengan prosentase 83,2%.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara derajat BBLR dengan tingkat keparahan asfiksia Neonatorum di RSUD Kabupaten Karanganyar, yang berarti semakin berat derajat BBLR maka semakin tinggi tingkat keparahan asfiksia neonatorum.

5.2. Saran

1. Institusi
Perlunya diadakannya promosi, konseling dan penyuluhan kepada masyarakat terutama usia produktif mengenai BBLR dan asfiksia neonatorum. Sehingga dapat meminimalisir angka morbiditas dan mortalitas BBLR dan asfiksia neonatorum.
2. Masyarakat
Sebagai referensi informasi mengenai bayi resiko tinggi terutama BBLR dan asfiksia neonatorum. Sehingga diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan ibu hamil maupun janin, dan dapat mencegah terjadinya komplikasi penyakit neonatus yang lebih besar terutama BBLR.
3. Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dianalisis lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya dengan menyempurnakan metode penelitian, menambah atau memperluas sampel, variabel lainnya, memperketat

kriteria inklusi dan eksklusi untuk mengetahui hubungan BBLR dengan asfiksia neonatorum.

