

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kadar total protein antara pembendungan segera dan ditunda 2 menit dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Rerata kadar total protein pada pembendungan segera adalah 8,556 g/dL dengan hasil terendah 6,9 g/dL dan hasil tertinggi 9,8 g/dL.
2. Rerata kadar total protein pada pembendungan yang ditunda 2 menit adalah 9,081 g/dL dengan hasil terendah 8,1 g/dL dan hasil tertinggi 10,1 g/dL.
3. Ada perbedaan hasil kadar total protein antara pembendungan segera dan ditunda 2 menit pada pengambilan darah vena.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Bagi tenaga laboratorium dalam melakukan pengambilan darah vena hendaknya menggunakan pembendungan segera tanpa penundaan terhadap pemeriksaan kadar total protein supaya memperoleh hasil yang tepat.
2. Penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan penelitian mengenai pengaruh pembendungan segera dan setelah dilepas 2 menit kemudian dilakukan pembendungan kembali terhadap pemeriksaan kadar total protein.