

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Skripsi, Agustus 2018

Nurul Khikmah Felayati

Kondisi psikologis depresi pasien dengan penyakit ginjal kronik (PGK) yang menjalani hemodialisa

xiii + 51 halaman + 12 tabel + 2 skema + 9 lampiran

Abstrak

Orang-orang dengan PGK yang menjalani hemodialisis hidupnya menjadi tergantung pada teknologi dan tenaga ahli yang professional. Mereka hidup dengan pengalaman yang berbeda dan banyak rasa sakit, mereka hidup dengan ketakutan serta ancaman kematian sehingga menyebabkan terjadinya depresi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi psikologis depresi pasien PGK yang menjalani Hemodialisa di RS Roemani Muhammadiyah Semarang. Rancangan penelitian ini adalah studi deskriptif. Responden penelitian ini pasien yang menderita penyakit ginjal kronik yang menjalani HD. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah 68 responden. Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar tingkat depresi pada pasien hemodialisa yang kurang dari 6 bulan dalam kategori sangat parah sebanyak 56,6% dan yang lebih dari 6 bulan sebagian besar kategori sedang sebanyak 26,3%. Hasil analisis terdapat perbedaan yang bermakna tingkat depresi pada pasien HD yang kurang dari 6 bulan dan lebih dari 6 bulan. Berdasarkan hasil tersebut maka pasien gagal ginjal sebaiknya dapat mengembangkan konsep diri dengan baik sehingga mampu menerima diri dengan keadaan apa adanya guna mengurangi rasa depresi akibat penyakit yang diderita.

Kata kunci : depresi, gagal ginjal kronis.

Pustaka : 43 (2007 -2016)

**BACHELOR OF NURSING PROGRAM
FACULTY OF NURSING AND HEALTH SCIENCE
UNIVERSITY OF SEMARANG MUHAMMADIYAH**

Undergraduate Thesis, August 2018

Nurul Khikmah Felayati

Psychological conditions of depression for patients with Chronic Kidney Disease (CKD) who undergo hemodialysis

xiii + 51 pages + 12 tables + 2 schemes + 9 attachments

Abstract

People with CKD who undergo hemodialysis of their lives become dependent on technology and professional experts. They live with different experiences and a lot of pain. They live with fear and the threat of death causing depression. The purpose of this study was to determine the psychological condition of depression of CKD patients undergoing Hemodialysis at Roemani Muhammadiyah Hospital Semarang. The design of this study is a descriptive study. Respondents of this study were patients who suffered from chronic kidney disease who underwent Haemodialysis. The sampling technique used is total sampling with a total of 68 respondents. The results showed that most of the depression levels in HD patients who were less than 6 months were in the very severe category as much as 56.6% and those who were more than 6 months were mostly in the moderate category as much as 26.3%. The results of the analysis showed a significant difference in the level of depression in hemodialysis patients who were less than 6 months and more than 6 months. Based on these results, patients with renal failure should be able to develop their self-concept well so that they are able to accept themselves as they are to reduce depression due to the illness.

Keywords: depression, chronic kidney failure.

Reader: 43 (2007-2016)