

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian dilakukan terhadap 52 responden, terdiri dari 26 kasus dan 26 kontrol. Kemudian dilakukan pengolahan data dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Risiko

- a. Responden yang memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta sebesar 73,1%. Ada hubungan antara riwayat kontak dengan kejadian kusta. ($p = 0,029$, OR = 5,622 CI = 1,342 – 23,559)
- b. Responden dengan lama kontak lebih dari 2 tahun sebesar 62,7%. Ada hubungan antara lama kontak dengan kejadian kusta. ($p = 0,027$, OR = 4,667, CI = 1,341 - 16,239).
- c. responden dengan personal hygiene baik sebesar 59,6%. Ada hubungan antara personal hygiene dengan kejadian kusta. ($p = 0,001$, OR = 10,389, CI = 2,728 – 39,560).

2. Bukan Faktor Risiko

- a. Responden dengan kepadatan hunian rendah sebesar 65,4%. Tidak ada hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian kusta. ($p = 0,382$, OR = 1,990, CI = 0,621 – 6,379).
- b. Responden yang memiliki jarak rumah dekat (kurang dari 11,6 meter) sebesar 55,8%. Tidak ada hubungan antara jarak rumah dengan kejadian kusta. ($p = 1,000$, OR = 0,856, CI = 0,286 – 2,558).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kusta di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan, yaitu :

1. Bagi puskesmas

kepada petugas kesehatan untuk lebih aktif dalam melakukan pemeriksaan kontak serumah kepada semua anggota keluarga yang tinggal serumah dengan penderita kusta agar tidak ada lagi penderita kusta yang mengalami kecacatan karena terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam mengenal secara dini penyakit kusta dan masyarakat yang mempunyai keluarga positif menderita kusta dengan kontak erat dapat melakukan pemeriksaan. Selain itu Kepada masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita kusta diharapkan untuk lebih memperhatikan personal hygiene agar dapat tercegah dari penularan penyakit kusta.

3. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian kusta, seperti Riwayat kontak, lama kontak, dan personal hygiene.