

**ASUHAN KEBIDANAN KEHAMILAN PATOLOGI
PADA NY K G2P1A0, UMUR 35 TAHUN, HAMIL 34 MINGGU 4 HARI
DENGAN HAMIL SUNGSANG
DI PUSKESMAS GEYER II**

Netty Susana¹⁾, Novita Nining Anggraini, S.ST,M.Kes²⁾, Erna Kusumawati, S.ST,M.Kes³⁾
¹⁾²⁾³⁾ Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas
Muhammadiyah Semarang
Email : nettysusana79@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Angka kematian ibu dan bayi di kabupaten Grobogan juga mengalami penurunan, tahun 2015 kematian ibu sebesar 149,92/ 100.000 KH, tahun 2016 turun menjadi 127,19/100.000 KH. Angka kematian bayi juga mengalami penurunan tahun 2015 sebesar 17,44/1.000 KH, tahun 2016 turun menjadi 17,22/1.000 KH (Dinkes Grobogan, 2016). Angka kejadian kehamilan letak sungsang di Puskesmas Geyer II Kabupaten Grobogan tahun 2017 sebanyak 7 kasus, ada 4 persalinan dirumah sakit dengan sectio caesarea (ibu dan bayi sehat), 1 persalinan spontan di Rumah Sakit (ibu dan bayi sehat), 1 persalinan di Puskesmas spontan (ibu dirujuk karena perdarahan, bayi meninggal). Kehamilan merupakan proses yang alamiah, bila tidak dikelola dengan baik akan memberikan komplikasi pada ibu dan janin dalam keadaan sehat dan aman. Kehamilan dengan letak sungsang juga merupakan salah satu penyebab faktor resiko angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tujuan penanaman letak sungsang pada masa kehamilan adalah untuk mencegah malpresentasi pada waktu persalinan (Sarwono,2009). Metode yang digunakan dalam kasus ini adalah observasi dengan menggunakan 7 langkah varney. **Hasil :** Pada kasus Ny. K dengan hamil sungsang setelah dilakukan asuhan kebidanan dengan knee chest selama 2 minggu secara teratur dan terpantau hasilnya dari presentasi bokong menjadi presentasi kepala.

Keyword : Kehamilan patologi, letak sungsang
Literature : 11,2010-2017

**MIDWIFERY CARE OF PATHOLOGICAL PREGNANCY
IN MRS K G2P1A0, 35 YEARS OLD, 34 WEEK 4 DAYS PREGNANT
WITH BREECH PREGNANT
IN PUSKESMAS GEYER II**

Netty Susana 1), Novita Nining Anggraini, S.ST, M.Kes 2), Erna Kusumawati, S.ST, M.Kes 3)

1) 2) 3) D III Midwifery Program Study, Health and Nursing Faculty

Muhammadiyah University of Semarang

Email: nettysusana79@gmail.com

ABSTRACT

Background: Maternal and infant mortality rates in Grobogan Regency decreased, in 2015 maternal deaths amounted to 149.92 / 100,000 KH (live births), in 2016 decreased to 127.19 / 100,000 KH. The infant mortality rate also decreased in 2015 by 17.44 / 1,000 KH, in 2016 it dropped to 17.22 / 1,000 KH (Dinkes Grobogan, 2016). The incidence of breech pregnancy in Puskesmas Geyer II Grobogan Regency in 2017 was 7 cases, 4 births in hospital with Caesarean section (mom and baby healthy), 2 spontaneous births in hospital (mom and baby healthy), 1 spontaneous birth in Puskesmas (mom taken to the hospital because of bleeding, the baby dies). Pregnancy is a natural process, if it is not managed properly it will give complications to the mom and fetus healthy. Pregnancy with breech position is also one of the causes of maternal and infant mortality. The purpose of handling breech position during pregnancy is to prevent malpresentation on childbirth (Sarwono, 2009). The method used in this case is observation using 7 steps of Varney. **Result :** The case of Mrs. K with breech pregnancy, after midwifery care with 2 weeks knee chest regularly are monitored from ass presentation to head presentation.

Keyword : Pathological Pregnancy, Breech Position

Literature : 11,2010-2017