

**ASUHAN KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN NIFAS  
PADA NY.M, UMUR 36 TAHUN, PIII A0, 2 JAM POST PARTUM  
DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI PUSKESMAS KARANGANYAR  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Khumaroh<sup>1)</sup>, Dewi Puspitaningrum, S.ST.M.Kes<sup>2)</sup>,Fitriani Nur Damavanti, S.ST.M.HKes<sup>3)</sup>**

<sup>1)2)3)</sup> Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Semarang  
Email : bidan@unimus.ac.id

**ABSTRAK**

Latar Belakang : Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi, di jawa tengah pada tahun 2016 adalah 109,65 (602 kasus), diantara penyebab kematian ibu dijawa tengah 27,08% karena hipertensi pada kehamilan. (Dinas Kesehatan Jateng, 2016). Di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 tercatat ada 16 kasus kematian ibu dimana 6 kasus (37,5%) meninggal sesudah bersalin/nifas, dari 6 kematian tersebut ada 4 kasus (66,67%) yang disebabkan karena Preeklampsia/Eklampsia. (Dinkes Kab.Pekalongan, 2014-2017). Sedangkan di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah tercatat AKI tahun 2015 ada 4 kasus (100%), meninggal pada saat nifas 1 kasus (25%), karena Preeklampsia/Eklampsia dan pada tahun 2017 ada 1 kasus (100%) meninggal pada saat nifas dan disebabkan karena Preeklampsia. (Puskesmas Karanganyar, 2015-2017). Preeklampsia ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Preeklampsia dibagi dalam 2 golongan yaitu Preeklampsia ringan dan Preeklampsia berat. Tujuan : Mengetahui dan mampu melaksanakan asuhan kebidanan kegawatdaruratan Nifas dengan Preeklampsia dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan Varney. Metode : Menggunakan metode diskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan metode Varney. Hasil : Setelah dilakukan asuhan kebidanan dengan istirahat tidur baring kepada Ny. M, umur 36 Tahun, PIII A0, 2 jam post partum dengan Preeklampsia Ringan, tekanan darah kembali normal. Kesimpulan : Pada Ny. M, umur 36 tahun, PIII A0, 2 jam post partum dengan Preeklampsia Ringan, setalah dilakukan asuhan kebidanan dengan istirahat tidur baring, sesuai teori, maka kondisinya kembali normal.

Kata kunci : Nifas Preeklampsia Ringan

Literature : 19, 1999-2018

**MIDWIFERY CARE OF PUPERAL EMERGENCIES MOTHER  
TO Mrs.M 36 YEARS OLD, PIII A0, 2 HOURS POST PARTUM  
WITH MILD PREECCLAMPSIA AT PUSKESMAS KARANGANYAR  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Khumaroh<sup>1)</sup>, Dewi Puspitaningrum, S.ST.M.Kes<sup>2)</sup>,Fitriani Nur Damavanti, S.ST.M.HKes<sup>3)</sup>**

<sup>1)2)3)</sup> DIII Midwifery Program Study Health And Nursing Faculty  
Universitas Muhammadiyah Semarang  
Email : bidan@unimus.ac.id

**ABSTRACT**

Background study : A maternal mortality rate still high, in centra of java in 2016 year is 109,65 (602 Case), Between there cause a maternal mortality rate in centra of java 27,08% caused by hypertension on the pregnancy. (Department of health centra of java, 2016). In Pekalongan 2017, there were 16 cases of maternal deaths in which 6 cases of (37,5 %) died after giving birth/postpartum, of the 6 deaths there were 4 cases (66,6%) caused by preeclampsia/exlampsia. (Department of health Pekalongan 2014-2017). Whereas in Puskesmas Karanganyar, Pekalongan district of centra java was recorded a maternal mortality rate in 2015 there were 4 cases (100%), died during childbirth, 1 case (25%), because preeklampsia/ eclampsia and in 2017 there was 1 case (100%) died during childbirth and was due to preeklampsia. (Puskesmas Karanganyar 2015-2017). Preeclampsia is a disease with signs of hypertension, edema and proteinuria that arise due to pregnancy. Preeclampsia is devided into 2 groups, namely mild preeclampsia and severe preeclampsia. Purpose:Knows and able to carry out postpartum obstetric midwifery care with preeclampsia using the varney midwifery management approach. Method : Using descriptive method in the study case with using the varney midwifery management approach method. Result : After doing midwifery care with bed rest to Mrs.M 36 years old, PIII A0, 2 hours post partum with Mild Preeclampsia, blood pressure returns to normal. Conclusion: In to Mrs.M 36 years old, PIII A0, 2 hours post partum with Mild Preeclampsia, after doing midwifery care with bed rest to according to the theory, the condition returns to normal.

Key words: Postpartum mild preeclampsia

Literature : 19, 1999-2018