

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan kebidanan dengan menggunakan Manajemen kebidanan menurut varney pada Ny.M, umur 36 tahun, PIII A0, 2 jam post partum dengan preeklamsia ringan maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengkajian pada kasus Ny.M, umur 36 tahun, PIII A0 Nifas dengan Preeklamsia ringan didapatkan keluhan utama ibu mengatakan bengkak pada tangan dan kaki.Sedangkan pada data obyektif didapatkan tiga tanda dari preeklamsia ringan yaitu tekanan darah 140/90 mmHg, Protein urine (+1), oedem pada tangan dan kaki
2. Interpretasi data diperoleh dari pengumpulan data yang diambil dari pengkajian sehingga didapatkan didapakan diagnosa kebidanan Ny.M, umur 36 th,PIII A0 nifas dengan preeklamsia ringan.Masalah gangguan rasa nyaman sehubungan dengan adanya bengkak di tangan dan kaki
3. Diagnosa potensial pada kasus Ny.M, umur 36 th, PIII A0 dengan preeklamsia ringan adalah terjadi PEB dan Eklamsia
4. Antisipasi pada kasus Ny.M, umur 36 th, PIII A0 dengan preeklamsia ringan adalah dengan Istirahat baring
5. Rencana tindakan yang dilakukan pada kasus Ny.M, umur 36 th, PIII A0 dengan preeklamsia ringan Jelaskan tentang kondisi ibu saat ini adalah, Jelaskan tentang keluhan yang dialami ibu, Jelaskan pada ibu bahwa harus istirahat sebagai terapi dari Preeklamsia ringan yang dialaminya, Jelaskan pada ibu tentang diet sesuai kondisi ibu, Beritahu ibu tentang tanda-tanda bahaya Preeklamsia pada masa nifas, Pantau TTV
6. Pelaksanaan dari asuhan yang diberikan pada Ny.M, umur 36 th,PIII A0 dengan preeklamsia ringan sesuai dengan apa yang direncanakan

7. Evaluasi dari asuhan yang diberikan pada Ny.M, umur 36 th, PIII A0 dengan preeklamsia ringan ibu mengerti ada gangguan kesehatan pada dirinya yaitu Preeklampsia ringan dan ibu mau menuruti saran dari petugas untuk mengembalikan kondisinya sampai normal kembali agar tidak terjadi Preeklampsia berat maupun Eklampsia
8. Pada kasus Ny.M, umur 36 th, PIII A0 dengan preeklamsia ringan antara teori dan kasus tidak ada kesenjangan pada perencanaan dan tindakan dan dari hasil penanganan tekanan darah pasien normal kembali, dan pasien bisa pulang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ;

1. Penulis
Dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dan serta dapat menerapkan teori dan praktek dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien dengan preeklamsia ringan..
2. Tenaga Kesehatan
Dapat meningkatkan mutu pelayanan yang sesuai dengan teori dalam menangani kasus preeklamsia ringan.
3. Institusi
Dapat digunakan sebagai masukan sumber bacaan atau referensi bagi Mahasiswa maupun pengajar untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.