

**ASUHAN KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN NIFAS  
PADA NY.M, UMUR 36 TAHUN, PIII A0, 2 JAM POST PARTUM  
DENGAN PREEKLAMPSIA RINGAN DI PUSKESMAS KARANGANYAR  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Khumaroh1), Dewi Puspitaningrum, S.ST.M.Kes 2),Fitriani Nur Damavanti,  
S.ST.M.HKes3)**

1)2)3) Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Semarang  
Email : bidan@unimus.ac.id

**MANUSKRIP**

Latar Belakang : Angka Kematian Ibu (AKI) masih sangat tinggi, di Jawa Tengah pada tahun 2016 adalah 109,65 (602 kasus), diantara penyebab kematian ibu di Jawa Tengah 27,08% karena hipertensi pada kehamilan. (Dinas Kesehatan Jateng, 2016). Di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2017 tercatat ada 16 kasus kematian ibu dimana 6 kasus (37,5%) meninggal sesudah bersalin/nifas, dari 6 kematian tersebut ada 4 kasus (66,67%) yang disebabkan karena Preeklampsia/Eklampsia. (Dinkes Kab.Pekalongan, 2014-2017). Sedangkan di Puskesmas Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tercatat AKI tahun 2015 ada 4 kasus (100%), meninggal pada saat nifas 1 kasus (25%), karena Preeklampsia/Eklampsia dan pada tahun 2017 ada 1 kasus (100%) meninggal pada saat nifas dan disebabkan karena Preeklampsia. (Puskesmas Karanganyar, 2015-2017). Preeklampsia ialah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema, dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Preeklampsia dibagi dalam 2 golongan yaitu Preeklampsia ringan dan Preeklampsia berat. Tujuan : Mengetahui dan mampu melaksanakan asuhan kebidanan kegawatdaruratan Nifas dengan Preeklampsia dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan Varney. Metode : Menggunakan metode diskriptif dalam bentuk studi kasus dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan metode Varney. Hasil : Setelah dilakukan asuhan kebidanan dengan istirahat tidur baring kepada Ny. M, umur 36 Tahun, PIII A0, 2 jam post partum dengan Preeklampsia Ringan, tekanan darah kembali normal. Kesimpulan : Pada Ny. M, umur 36 tahun, PIII A0, 2 jam post partum dengan Preeklampsia Ringan, setelah dilakukan asuhan kebidanan dengan istirahat tidur baring, sesuai teori, maka kondisinya kembali normal.

Kata kunci : Nifas Preeklampsia Ringan

Literature : 19, 1999-2018