

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
PROGAM STUDI DIII KEBIDANAN
TAHUN 2018

ABSTRAK

Yanti*. Nuke Devi Indrawati. Siti Nurjanah****

ASUHAN KEBIDANAN NIFAS PATOLOGIS DENGAN ABSES PAYUDARA PADA NY D UMUR 42 TAHUN PIII P0 DI PUSKESMAS TIRTO II PEKALONGAN

(xi + 55 halaman + 11 tabel + 1 bagan + 8 lampiran)

Latar Belakang : Masa nifas sangat penting karena merupakan masa kritis pada ibu dan bayi. Penyebab AKI terbesar di Indonesia perdarahan (28%), infeksi (11%), eklamsia (24%). Kegagalan proses menyusui bisa menjadi Abses payudara.

Tujuan : Memberikan asuhan kebidanan nifas pada Ny D PIII A0 umur 42 tahun dengan abses payudara.

Metode : LTA adalah laporan studi kasus menggunakan metode memperoleh data yang digunakan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang keadaan secara obyektif.

Hasil : Asuhan kebidanan telah diberikan pada Ny D dan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan perencanaan yang telah disesuaikan dengan masalah yang ada. Sesuai diagnosis kebidanan, tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus. Evaluasi pada hari ke 42 post partum, ibu telah membaik.

Kesimpulan : Dari kasus Ny D tidak terdapat kesenjangan antara teori dan kasus. Ibu sehat, ibu pulih dan dapat memberikan ASI kepada bayinya, yang merupakan sumber makanan bagi bayinya.

Kata Kunci : Nifas, Abses payudara

* Mahasiswa program studi DIII kebidanan universitas muhammadiyah semarang

** dosen universitas muhammadiyah semarang

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SEMARANG
FACULTY OF NURSING AND HEALTH
MIDWIFERY DIPLOMA III STUDY PROGRAM
YEAR OF 2018

ABSTRACT

Yanti*. Nuke Devi Indrawati. Siti Nurjanah****

MIDWIFERY CARE FOR PATHOLOGICAL POSTPARTUM WITH BREAST ABSCESS TO MRS. D AGED 42 YEARS PIII P0 AT TIRTO HEALTH CENTER II OF PEKALONGAN

(xi + 55 pages + 11 tables + 1 theoretical framework + 8 attachments)

Background: Postpartum period is very important because it is the critical period for the mother and the baby. The biggest causes of MMR in Indonesia are bleeding (28%), infection (11%), and eclampsia (24%). The failure of the breastfeeding process can be due to a breast abscess.

Purpose: Giving midwifery care for postpartum to Mrs. D PIII A0 aged 42 years with breast abscess.

Method: This study is used a method of obtaining data that is used with the main purpose to create an overview of the situation objectively.

Result: Midwifery care has been given to Mrs. D and the implementation has done according to the plan and has been matched with the problem. According to the midwifery diagnosis, there is no gap between the theory and the case. Evaluation on the day 42 of postpartum, the mother has getting better.

Conclusion: From the Mrs. D's case, there is no gap between theory and the case. The mother is well, and able to give breastfeeding to her baby which is the source of food for the baby.

Key Words: Postpartum, Breast abscess

* Student of Midwifery Diploma III Study Program of Muhammadiyah University of Semarang

** Lecturer of Muhammadiyah University of Semarang