

**ASUHAN KEBIDANAN KEGAWATDARURATAN PADA NY. M  
UMUR 38 TAHUN PIVA0 DENGAN PERDARAHAN POSTPARTUM 2 JAM  
KARENA ATONIA UTERI DI RSUD KRATON PEKALONGAN**

**Fajariyatun<sup>1)</sup>, Dewi Puspitaningrum<sup>2)</sup>, Lia Mulyanti<sup>3)</sup>**

<sup>1)2)3)</sup> Program Studi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Angka kematian ibu di Indonesia tahun 2017 (semester 1) 1712 kasus. AKI Provinsi Jateng pada tahun pada 2017 adalah 88,58 per 100 ribu kelahiran hidup. Berdasarkan data RSUD Kraton Pekalongan diketahui bulan Januari-Maret 2018 sebanyak 259 persalinan dengan 4 (1,5%) kasus postpartum hemorragie, 1 diantaranya perdarahan karena atonia uteri. Walaupun angkanya kecil mengingat bahayanya apabila tidak ditangani dengan tindakan yang cepat dan tepat akan menyebabkan syok hipovolemik yang berakibat pada kematian.

**Tujuan :** Memberikan asuhan kebidanan pada Ny. M umur 38 th PIVA0 dengan perdarahan postpartum karena atonia uteri di RSUD Kraton Pekalongan sesuai dengan manajemen kebidanan varney.

**Metode :** Laporan Tugas Akhir ini merupakan laporan studi kasus menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan dengan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Studi kasus ini akan mendeskripsikan tentang asuhan kebidanan pada Ny. M umur 38 th PIVA0 dengan perdarahan postpartum 2 jam karena atonia uteri di RSUD Kraton Pekalongan.

**Hasil :** Asuhan kebidanan yang telah diberikan pada Ny. M adalah masase fundus uteri, memasang oksigen, membersihkan bekuan darah, melakukan kompresi bimanual interna selama 2x 5 menit, memberikan injeksi metergin 0,2 mg IM, memasang infus drip oksitosin dan melakukan histerektomi. Setelah dilakukan asuhan kebidanan dan observasi selama 5 hari kesadaran pasien baik dan perdarahan terhenti.

**Kesimpulan :** Ny. M dilakukan histerektomi dan keadaan Ny. M sehat. Kasus Ny. M terdapat kesenjangan antara teori dan kasus dalam rencana asuhan yaitu tidak dilakukan Kompresi Bimanual Eksterna dan evaluasi yaitu dilakukan histerektomi.

Keyword : Nifas , Postpartum Hemoragik, Atonia Uteri  
Literatur : 2005-2016

**SEMARANG**

**MIDWIFERY EMERGENCY CARE IN MRS. M AGE 38 YEARS OLD PIVA0 2 HOURS  
POST PARTUM HEMORRAGIE BLOOD BECAUSE OF UTERIC ATONIA  
AT REGIONAL PUBLIC HOSPITAL KRATON PEKALONGAN**

**Fajariyatun 1), Dewi Puspitaningrum2), Lia Mulyanti 3)**

**1) 2) 3) Diploma III of Midwifery Study Program**

**Faculty of Nursing and Health Science**

**University of Muhammadiyah Semarang**

**ABSTRACT**

**Background:** Maternal mortality rate in Indonesia in 2017 (semester 1) 1712 cases. Central Java Province AKI in 2017 is 88.58 per 100 thousand live births. Based on data from Kraton Pekalongan Hospital, it is known that from January-March 2018 as many as 259 deliveries with 4 (1.5%) cases of postpartum hemorrhage, 1 of them bleeding from uterine atony. Even though the number is small, but it is become danger if not treated with quick and appropriate action so that will cause of hypovolemic shock and also death.

**Purpose:** Provide midwifery care to Mrs. M age 38 PIVA0 with 2 hours postpartum hemorrhage because uterine atony in Regional Public Hospital Kraton Pekalongan is in accordance with varney obstetric management.

**Method:** This Final Assignment Report is a case study report using descriptive method which is a research method that is used to know the description of a situation objectively. This case study will describe midwifery care in Mrs. M age 38 PIVA0 with 2 hours postpartum hemorrhage due to uterine atony in Kraton Pekalongan Hospital

**Results:** Midwifery care given to Mrs. M is an uterine fundus massage, installed oxygen, cleared blood clots, performed internal bimanual compression for 2x 5 minutes, gave a metergin 0.2 mg IM injection, placed an oxytocin drip infusion and performed a hysterectomy. After midwifery care and observation for 5 days, consciousness of the patient's is good and bleeding stops.

**Conclusion:** Mrs. M performed hysterectomy and the state of Ny. Healthy. Mrs. Case There is a gap between theory and case in the care plan that is not carried out External Bimanual Compression and evaluation is done hysterectomy.

Keyword: Postpartum, Postpartum Hemoragic, Atonia Uteri

Literature: 2005-2016

**SEMARANG**