

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RS Roemani Muhammadiyah Semarang tentang faktor-faktor penyebab kejadian asfiksia di RS Roemani Muhammadiyah Semarang dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab asfiksia dari faktor ibu di dapati ada beberapa faktor yaitu pre eklamsia dan eklamsia sebanyak 9 responden (41%), plasenta previa/solusio plasenta sebanyak 4 responden (18%), infeksi berat sebanyak 3 responden (14%), dan kehamilan post matur sebanyak 6 responden (27%)
2. Penyebab asfiksia dari faktor bayi didapati ada beberapa faktor yaitu prematuritas sebanyak 14 responden (47%), air ketuban bercampur mekonium sebanyak 10 responden (34%), persalinan sulit sebanyak 6 responden (20%)
3. Penyebab kejadian asfiksia dari faktor tali pusat ada beberapa faktor yaitu lilitan tali pusat pusat 6 responden (100%)

B. Saran

1. Bagi instansi rumah sakit

Disarankan bagi instansi rumah sakit dan tenaga kesehatan diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi kejadian asfiksia pada bayi baru lahir prematur serta melakukan upaya menurunkan kelahiran bayi prematur untuk menurunkan angka kejadian asfiksia

2. Bagi institusi

Disarankan bagi institusi pendidikan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa.

3. Bagi masyarakat terutama ibu hamil

Disarankan bagi ibu hamil menjaga kondisi kesehatannya selama hamil yaitu dengan melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan sehingga resiko selama kehamilan dan persalinan dapat diminimalkan.