## **BAB V**

## SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Simpulan

Hasil pemeriksaan HBsAg pada 14 bayi yang diimunisasi HBIG di puskesmas wilayah Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal diperoleh 100% bayi non reaktif HBsAg meski dilahirkan dari ibu yang reaktif HBsAg. Hal ini menunjukkan tidak adanya penularan perinatal maupun post natal dari ibu yang reaktif terhadap bayinya yang diberi imunisasi HBIG setelah 12 jam lahir, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian HBIG pada bayi sangat efektif.

## 5.2 Saran

Penelitian dapat dilajutkan dengan menambah variabel lainnya terkait riwayat HBsAg positif yang dimiliki ibu reponden, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Diharapkan ada penelitian selanjutnya yang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui keefektifan imunisasi HBIG setelah anak berumur diatas 1 tahun apakah setelah berumur lebih dari 1 tahun hasil pemeriksaan HBsAg tetap non reaktif dengan kebiasaan hidup sehari hari seperti bayi yang diberi ASI sama yang tidak diberi ASI, bayi dengan ibu pengobatan dengan yang tidak diobati dan cara mencuci pakaian antara yang dicampur dengan yang dipisah dengan keluarga yang lainnya.