

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Prevalensi kecacingan positif pada petugas sampah 60,53 % , dan kecacingan negatif 39,47 %.

- a. Petugas sampah memiliki kesadaran dalam memakai APD dan terinfeksi kecacingan dengan prevalensi 55,26%,
- b. Petugas sampah yang mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan terinfeksi kecacingan diperoleh prevalensi sebesar 26,31%,
- c. Petugas sampah yang memotong kuku dan terinfeksi kecacingan dengan prevalensi 34,21%,
- d. Petugas sampah yang mengkonsumsi obat cacing prevalensi 0%.

Angka prevalensi kecacingan tetap tinggi, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran petugas mengkonsumsi obat cacing.

5.2 Saran

Petugas sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang untuk memakai alat pelindung diri yang memenuhi syarat sehingga tidak terkena penyakit yang berhubungan dengan kecacingan. Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pemberian pengertian bahwa konsumsi obat cacing bertujuan untuk tindakan pencegahan kecacingan bukan hanya pengobatan.