

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan asuhan kebidanan komprehensif yang dimulai dari hamil usia 37⁺⁴ minggu, bersalin (kala I,II,III dan IV), nifas selama 2 minggu dan alat kontrasepsi, serta bayi baru lahir selama 2 minggu.

Penelitian ini dimulai dari 01 Januari 2019 sampai dengan Mei 2019

penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehamilan

Pada kehamilan trimester III ibu telah melakukan kunjungan 4 kali dimulai dari tanggal 17 Januari 2019 s/d 6 Maret 2019 di Puskesmas Bangetayu Semarang. Pada kunjungan ke 5 usia kehamilan 21 minggu tanggal 15 November 2018 ibu melakukan suntik imunisasi TT₄. Pada usia kehamilan 37⁺⁴ minggu didapati hasil pemeriksaan TFU 34 cm dengan TBJ 3565 gram dengan BB ibu sebelum hamil 58 sampai dengan menjelang persalinan BB hamil 68,4 kg, dan tidak didapati kesenjangan apapun dalam pemeriksaan.

2. Persalinan

Ibu bersalin pada tanggal 07 Maret 2019 pukul 01.00 WIB dengan usia kehamilan 37⁺⁵ minggu. Dimana pada kala I fase aktif berlangsung 2 jam 45 menit dari pembukaan 5 cm pukul 22.00 WIB sampai dengan 10 cm pukul 00.45 WIB. Kala II berlangsung 15 menit dengan lahirnya bayi pukul 01.00 WIB dengan hasil bayi menangis kuat, kulit kemerahan, gerakan aktif, anus berlubang dan *apgar score* 9/10/10 pada menit 1/5/10. Kala III lahirnya plasenta berlangsung selama 10 menit dengan sebelumnya penyuntikan *oksitosin* 10 iu di 1/3 paha kiri atas dan plasenta lahir lengkap, kemudian dilakukan

masase ± 15 detik. Pada kala IV dilakukannya pemantauan 2 jam setelah bayi dan plasenta lahir lengkap.

Dari hasil kala I, II, III, IV bahwasannya tidak ditemukan kesenjangan antara asuhan yang diberikan kepada pasien dengan teori dan Ny.R berlangsung secara normal dari kala I-IV.

3. Nifas

Kunjungan nifas dilakukan Selama 3 kali yaitu pada kunjungan pertama 6 jam postpartum tanggal 07 Maret 2019 pukul 07.15 WIB didapati hasil pemeriksaan *vital sign* dalam batas normal, TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi keras, kantung kemih kosong dan perdarahan ± 10 cc *lochea rubra*. kunjungan ke dua 6 hari postpartum tanggal 12 Maret 2019 pukul 17.30 WIB dengan hasil *vital sign* dalam batas normal, TFU pertengahan antara *simpisis*, kontraksi keras, perdarahan ± 3 cc *lochea sanguinolenta*. tanggal 19 Maret 2019 pukul 16.00 WIB kunjungan ketiga 14 hari/2 minggu postpartum dengan hasil pemeriksaan *vital sign* dalam batas normal, TFU tidak teraba diatas *simpisi*, perdarahan berwarna kekuningan coklat *lochea serosa*.

Pada pemasangan alat kontrasepsi pada tanggal 08 Maret 2019 pukul 10.00 WIB ibu memilih kontrasepsi implant dan sudah dilakukan pemasangan dan ibu sudah paham mengenai alat kontrasepsi implant dan efek sampingnya. Pada hari ke 6 tanggal 12 Maret 2019 hasil luka insisi sudah kering dan bagus.

Tidak terdapat kesenjangan antara asuhan yang diberikan dengan teori yang ada dalam laporan dan sudah sesuai dengan teori.

4. Bayi baru lahir

Bayi baru lahir tanggal 07 Maret 2019 pukul 01.00 WIB dengan lahir normal spontan, usia aterm, jenis kelamin perempuan, BB 2800

gr, PB 48 cm, menangis kuat, kulit kemerahan, gerakan aktif, anus berlubang, *apgar score* 9/10/10, tetes mata (*earlamycetin kloramefenikol* 25 mg/kg BB/hari) 1 tetes kanan-kiri sudah diberikan dan Vit.K 1mg sudah diberikan pukul 01.45 WIB. Kunjungan bayi baru lahir sebanyak 3 kali yaitu pada kunjungan pertama 6 jam post partum tanggal 07 Maret 2019 pukul 07.15 WIB dengan hasil pemeriksaan bayi sudah menyusui kuat, sudah dimandikan, sudah dilakukan perawatan tali pusat, ajarkan ibu menyusui teknik yang benar, sudah disuntikan HB0 1ml pukul 07.00 WIB, jaga bayi tetap hangat, ajari teknik menyusui yang benar dan sudah BAK dan BAB keluar *meconium*. Kunjungan ke dua 6 hari bayi baru lahir tanggal 12 Maret 2019 pukul 17.30 WIB hasil pemeriksaan BB 3000 gr, bayi sering tidur, menyusui kuat dan sering, tinja sudah berwarna kekuningan, anjurkan menjemur bayi supaya tidak *ikterik*. Pada kunjungna ke III tanggal 19 Maret 2019 pukul 16.00 WIB masa bayi 14 hari/2 minggu ibu mengatakan tidak ada keluhan, BB bayi 3100 gram, bayi menyusui kuat, ajari teknik menyusui yang benar, berikan KIE tanda bahaya bayi dan anjurkan bayi imunisasi BCG 1 bulan tanggal 07 April 2019, hasil evaluasi ibu sudah paham dan bersedia untuk anjuran yang disarankan oleh bidan.

Tidak ditemukan kesenjangan antara asuhan yang diberikan dengan teori asuhan bayi baru lahir sampai masa 14 hari.

B. Saran

1. Bagi pelayanan kesehatan

Diharapkan bagi pelayanan kesehatan tetap selalu memperhatikan asuhan yang di berikan kepada pasien dan tingkatkan asuhan yang sudah bagus dan dilaksanakan sebagaimana asuhannya.

2. Bagi instansi

Diharapkan dengan adanya Penulisan Tugas Akhir yang bersifat continuity of care dapat mempersiapkan mahasiswa lebih dini dalam menjalankan asuhan kebidanan komprehensif.

3. Bagi mahasiswa

Diharapkan mahasiswa dapat mempelajari dan lebih meningkatkan serta melengkapi asuhan komprehensif secara detail dengan melalui sumber acuan yang sebelumnya.

