

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
PROGRAM RPL D III KEBIDANAN
TAHUN 2019**

ABSTRAK

Farida * Dewi PuspitaningrumFitriani.**

**ASUHAN KEBIDANAN KEGAWAT DARURATAN IBU NIFAS PADA NT. T PIIA0
UMUR 37 TAHUN, 1 HARI POST PARTUM DENGAN PREEKLAMSI BERAT DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN PATI**

(vi + 43 halaman + 1 tabel + 5 lampiran)

Latar Belakang : Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 2015 penyebab angka kematian ibu adalah hipertensi atau pre eklamsi 23, 95%, perdarahan 17, 22% , infksi 4, 04%, proses audit 0.30% dan lain-lain 54, 49%. Jumlah kematian ibu Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 619 kasus. Dari data yang di dapat dari Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Kota Pati kasus pre eklamsi pada nifas merupakan kasus penyumbang kematian ibu di Jawa Tengah serta di beberapa wilayah kota di Jawa tengah yang dapat menjadi penyebab kematian ibu.

Tujuan : mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan pre eklamsi yang berat sesuai dengan manajemen kebidanan 7 langkah varney. **Hasil :** melakukan kolaborasi dengan dokter SpOG untuk memberikan terapi dosis awal MgSO₄ 4 gram 40% secara IV per 24 jam. **Kesimpulan :** setelah dilakukan perawatan konservatif selama 3 hari rawat inap pada Ny. T dengan Pre eklamsi yang berat. Ny T telah dilakukan perawatan konservatif selama 3 hari postpartum tekanan darah ibu turun menjadi 110 / 90 mmHg. Karena ibu tetap mengkonsumsi obat dari dokter yaitu Metodopamex 3 x 250 mg 1 tablet / 24 jam untuk pengobatan hipertensi.

Kata kunci : Nifas, Preeklamsi berat

Kepustakaan : 13, 2008 – 2016

* Mahasiswa Program RPL D III Kebidanan Universitas Muhammadiyah Semarang

** Dosen Universitas Muhammadiyah Semarang

**MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SEMARANG
FACULTY OF NURSING AND HEALTH SCIENCE
PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL OF STUDY DIPLOMA III
2019**

Farida * Dewi PuspitaningrumFitriani.**

**IBUNIFAS EMERGENCY PRIVATE VOCATIONAL SCHOOL, NT. T PIIA0 AGE 37
YEARS, 1 DAY POST PARTUM WITH WEIGHT PREECTION IN THE PATI GENERAL
HOSPITAL**

ABSTRACT

(vi + 43 + 1 table + 5 attachments)

Background: According to the Central Java Health Office in 2015 the cause of maternal mortality was hypertension or preeclampsia 23, 95%, bleeding 17, 22%, infection 4, 04%, audit process 0.30% and others 54, 49%. The number of maternal deaths in Central Java Province in 2015 was 619 cases. From the data obtained from the Kayen City General Hospital, Pati, pre-eclampsia cases in the post-partum period are the contributing cases of maternal mortality in Central Java and in some areas of the city in Central Java which can be the cause of maternal death. **Objective:** to be able to carry out midwifery care for postpartum pre-eclampsia with severe according to varney 7-step midwifery management. **Results:** collaborated with SpOG doctors to provide therapy for the initial dose of 4 grams 40% MgSO₄ IV per 24 hours. **Conclusion:** after conservative treatment for 3 days hospitalization at Ny. T with severe preeclampsia. Conservative care has been carried out for 3 days postpartum, maternal blood pressure drops to 110/90 mmHg. Because mothers still take medicine from doctors, namely Metodopamex 3 x 250 mg 1 tablet / 24 hours for the treatment of hypertension.

Keywords: Postpartum, Preeclampsia of rice

Literature: 13, 2008 – 2016

* Student of Midwifery Diploma III Study Program at Muhammadiyah University Semarang

** Lecturer in Muhammadiyah University Semarang

