

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana Dwi Indah V. 2014. Perbedaan hasil pemeriksaan glukosa darah menggunakan antikoagulan NaF dan NaEDTA. KTI, Analis Kesehatan, Malang.
- Albert, A. 2017. Perbedaan Kadar Glukosa Serum dan Plasma Natrium Flourida (NaF) dengan penundaan Pemeriksaan. Semarang : Universitas Diponegoro
- Assyifa H. 2016. Perbedaan Kadar Glukosa metode CHOD-PAP Menggunakan NaF Segera dan Ditunda 12 Jam Dan 24 Jam. Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang
- Gandasoebrata, R. 2013. *Petunjuk Laboratorium Klinik*. Jakarta : Dian Rakyat
- Hardjoeno H, DKK. 2007. *Interprestasi Hasil Tes Laboratorium Diagnostik* Hasanuddin University. Makassar
- Kurnianingsih, U. 2011. Perbandingan Hasil Pemeriksaan Glukosa Darah Menggunakan Antikoagulan NaF dan NaEDTA. Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang
- Lenywati, E. 2001. *Diabetes Mellitus Penyakit Kencing Manis*. Yogyakarta: Kanisius Media
- Lestari, D. D., Purwnato, D. S., & Kaligis, S. H. M. 2013. *Gambaran Kadar Glukosa Darah Puasa Pada Mahasiswa Angkatan 2011 Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Dengan Indeks Masa Tubuh 18,5- 22,9 kg/m²*. Jurnal e- Biomedik (Ebm) Volume 1, Nomer 2.
- Permenkes RI. 2013 Peraturan Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia Nomor 43. 2013. Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta
- Putri, Dwimi. 2017. Perbedaan Kadar Glukosa Plasma NaF yang diperiksa segera dan ditunda 4 jam: Universitas Muhammadiyah Semarang. Semarang
- Sacher, R.A. 2004. *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium*. EGC. Jakarta
- Safitri, Y., Sukeksi, A., & Ariyadi, T. 2017. *Perbedaan Glukosa Darah Sewaktu Segera dan Ditunda Antara Serum dan Plasma EDTA*. Semarang. Universitas Muhammadiyah Semarang
- Susiwati. 2018. *Perbedaan Kadar Glukosa Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Pada Plasma NaF Berdasarkan Waktu Pemeriksaan di RSUD dr. M. Yunus Provinsi Bengkulu Tahun 2017*. Bengkulu: Poltekkes Kemenkes Bengkulu