

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Dari hasil pemeriksaan tentang hitung jumlah leukosit terhadap 15 pasien penderita diare akut karena infeksi di Rumah Sakit St. Elisabeth Semarang didapatkan 5 sampel yang menunjukkan hasil leukosit lebih dari normal (33.33%) dengan jumlah tertinggi 22.900/ mm³ darah dan 10 sampel yang menunjukkan hasil leukosit yang normal (66.67%).
2. Hasil pemeriksaan tentang hitung jenis leukosit didapat bahwa yang menunjukkan hasil jenis eosinofil lebih dari normal ada 3 sampel, yang menunjukkan hasil sel neutrofil lebih dari normal ada 3 sampel, yang menunjukkan hasil sel limfosit lebih dari normal ada 2 sampel dan yang menunjukkan hasil sel monosit lebih dari normal ada 3 sampel.

B. Saran

1. Bagi pembaca untuk mencegah terjadinya diare sebaiknya mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menggunakan air bersih untuk mandi dan minum, menggunakan jamban yang bersih.
2. Perlu dilakukan pemeriksaan secara kuantitatif dengan pengambilan sampel yang lebih besar untuk mengetahui pengaruh diare pada jumlah leukosit.