# Identifikasi Total Bakteri dan Keasaman Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang disimpan di Cooler Bag

by Yuliana Ulvie

**Submission date:** 27-Jan-2023 01:19PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2000383860

File name: Keasaman\_Air\_Susu\_Ibu\_Perah\_ASIP\_yang\_disimpan\_di\_Cooler\_Bag.pdf (549.94K)

Word count: 3156 Character count: 17524

# Identifikasi Total Bakteri dan Keasaman Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang disimpan di Cooler Bag

<sup>1</sup>Dian Nintyasari Mustika, <sup>2</sup>Siti Nurjanah, <sup>3</sup>Yuliana Noor Setiawati Ulvie

1,2,3 Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang ulvieanna@gmail.com

#### ABSTRACT

Exclusive breastfeeding is mother's milk given to babies up to 6 months old babies without food and drink, except drugs and vitamins. The provision of ASI in Indonesia has not been fully implemented. Efforts to improve breastfeeding behavior in mothers who have babies, especially exclusive breastfeeding, are still considered lacking. One of the things that inhibits exclusive breastfeeding is often experienced by working mothers, including insufficient knowledge and conditions for working mothers. Workers must milk breast milk during working hours if they want to give breast milk exclusively. Stored breast milk must pay attention to the temperature level and duration of storage so that the baby is safely consumed. Cooler bags are an alternative to storing breast milk if there is no refrigerator at the place where the mother works. The purpose of this study was to find out the total bacterial identification and acidity of stored breast milk in a cooler bag.

This type of research is a description with cross sectional design. The population in this study were working mothers who provided breastfeeding through breast milk. The sample in this study was breast milk from the Worker's Mother. The results were analyzed descriptively.

The results showed that the treatment of slow freezing time had a significant effect on the total bacteria contained in breast milk with the result that the total bacteria in fresh breast milk showed a greater amount compared to breast milk stored in the cooler bag and pasteurized. The treatment of slow freezing time has a significant effect on the acidity of breast milk with the result that on day 0, fresh breast milk shows that the average range of breast milk pH ranges from pH 7.1 to 7.5 while on day 1 fresh milk showed that the average pH range of breast milk ranged from pH 5.5 to 6.6. ASI stored in cooler bags on day 0 the average pH range of breast milk ranged from pH 5.5 to 5.9, whereas on day 1 the average pH range of breast milk ranged from pH 5.9 to 6.6. Whereas in breast milk pasteurized on day 0 the average range of breast milk pH ranged from pH 7.1 to 7.7, whereas on day 1 the average pH range of ASI ranged from pH 5.9 to 6.7.

Keywords: stored breast milk, total bacteri, pH

# PENDAHULUAN

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sampai bayi berusia 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman, kecuali obat dan vitamin. Hak untuk mendapatkan ASI tercantum dalam UU No. 36 tahun 2009

Jurnal Gizi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019

pasal 128 ayat 1 yang berisi bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, 2012).

Kebijakan Nasional untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan telah ditetapkan dalam SK Menteri No. 450/Menkes/SK/IV/2004 (Depkes 2010). Pemberian ASI eksklusif juga telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008.PER.27/MEN/XII/2 008.dan1177/MENKES/PB/XII/2008

Tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja ("Peraturan Bersama"). Dalam Peraturan Bersama tersebut antara lain disebutkan bahwa Peningkatan Pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja adalah program nasional untuk tercapainya pemberian ASI eksklusif 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Tujuan peraturan bersama ini antara lain adalah memberi kesempatan kepada pekerja perempuan untuk memberikan atau memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya, memenuhi hak pekerja perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya, memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Pemberian ASI di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya. Upaya meningkatkan perilaku menyusui pada ibu vang memiliki bayi khususnya eksklusif masih dirasa kurang. Permasalahan yang utama adalah faktor sosial budaya, kesadaran akan pentingnya ASI, pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan belum yang sepenuhnya mendukung PP-ASI, gencarnya promosi susu formula dan ibu bekerja (Arimurti, 2007).

Data menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif di Indonesia hanya 15,3 % (Riskesdas, 2010). Salah satu penyebab utama rendahnya pemberian ASI di Indonesia selain faktor sosial budaya, juga masih kurangnya pengetahuan ibu hamil, keluarga, dan masyarakat.

Data Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2015 menunjukkan cakupan pemberian ASI eksklusif sekitar 61,6%, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 60,7% dan tahun 2013 yaitu 52,99%. Kabupaten/kota dengan presentase pemberian ASI eksklusif terrendah adalah Kota Semarang yaitu 6,72%, diikuti Kudus 13,1%, dan Tegal 33,4%. Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI eksklusif yaitu masih instansi/perusahaan banyaknya yang mempekerjakan perempuan tidak memberikan kesempatan bagi ibu yang

memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif, hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang lakatasi dan perangkat pendukungnya. Permasalahan lainnya antara lain yaitu masih banyak tenaga kesehatan di tingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan, dan juga belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi an kampanye terkait pemberian ASI. (Profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2015)

Beberapa hal yang menghambat pemberian ASI eksklusif di antaranya adalah, kondisi yang kurang memadai bagi ibu yang bekerja, rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga lainnya mengenai manfaat ASI dan cara menyusui kurangnya pelayanan yang benar, konseling laktasi dan dukungan dari petugas kesehatan, faktor sosial budaya dan gencarnya pemasaran susu formula (Roesli, 2005). Hasil penelitian Wulandari menyebutkan bahwa sebagian ibu bekerja Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang tidak melakukan praktik pemberian ASIP, sedangkan hasil penelitian dari Wahyuni menyebutkan bahwa diperlukan kebijakan khusus dari instansi tentang pemberian ASIP dan penyimpanannya.

Jurnal Gizi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019

Ibu pekerja harus memerah ASI selama jam kerja bila ingin memberikan ASI secara eksklusif. Namun, hal ini tidak karea perusahaan menyediakan pojok laktasi yang terdiri atas sofa/tempat duduk dan lemari Minimnya sarana yang disediakan untuk ibu menyusui, membuat ibu pekerja menjadi enggan untuk menjalankan ASI eksklusif. Penyimpanan ASIP harus memperhatikan level suhu dan durasi waktu penyimpanan agar tetap aman dikonsumsi bayi.

Penyimpanan ASIP dalam suhu ruang 15<sup>0</sup> C, aman dikonsumsi dalam 24 jam. Sedangkan untuk suhu ruang 19-22 °C ASIP bertahan selama 10 jam. Suhu ruang 25 °C, sebaiknya simpan ASIP selama 4-8 jam. Jika ASIP segar disimpan dalam kulkas dengan suhu 0-4 °C, ASI bisa bertahan hingga 3-8 hari. Sedangkan waktu penyimpanan ASIP segar di freezer tergantung model piranti tersebut. Jika disimpan dalam freezer di lemari es satu pintu, ASIP aman dikonsumsi hingga dua minggu. Sedangkan untuk freezer pada lemari es dua pintu, waktu penyimpanan, bulan. hingga 3-4 Jika disimpan di freezer khusus dengan di bawah 18 °C, ASIP aman disimpan hingga 6-12 bulan (Fazriyati, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin meneliti total bakteri dan keasaman, total bakteri dan keasaman Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang dipasteurisasi pada ibu pekerja berbasis waktu penyimpanan di *cooler* bag. Hasil penelitian ini dimaksudkan, agar para ibu pekerja tidak ragu memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Cooler bag menjadi alternatif untuk menyimpan ASIP apabila tidak tersedia lemari pendingin di tempat ibu bekerja. Sehingga, ASI ekslusif tetap dapat dijalankan selama 6 bulan dan dilanjutkan hingga bayi berusia 2 tahun.

## METODE PENELITIAN

bakteri dan Penelitian total keasaman ASI Perah dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ASI yang diperoleh dari 6 ibu karyawan Unimus yang menyusui bayinya usia 3-5 bulan, media Nutrien Agar (NA), larutan NaCl fisiologis 0.85%, alkohol, aquades. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pompa ASI, 15 botol kaca, cooler bag, blue ice, panci, kompor, termometer, cawan petri, pipet volum, erlenmeyer, gelas ukur, beker gelas, tabung reaksi, autoklaf, inkubator, kapas, lampu spiritus, almari es. Tehnik Pengumpulan Data dimulai dari persiapan Sampel

# a. Pemerahan ASI

Pompa dan botol dot dicuci sampai bersih. Kemudian dilakukan sterilisasi dengan cara direbus pada suhu 100°C selama kurang

Jurnal Gizi Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019

lebih 10 menit. ASIP diperoleh dari 6 ibu karyawti Unimus yang sedang menyusui bayinya usia 3-5 bulan. Pengambilan ASIP dilakukan dengan cara payudara dibersihkan dengan air matang terutama pada punting susu. ASIP dipompa sedikit demi sedikit kemudian dimasukkan ke dalam botol didapatkan kurang lebih 75 ml kemudian dihomogenkan.

## b. Pasteurisasi

Peralatan seperti kompor, panci dan termometer disiapkan. Kemudian ASIP yang berada pada botol dot disimpan dalam cooler bag kurang lebih 8 jam. Kemudian ASIP direbus dalam air dengan suhu 60-65 C selama 30 menit, kemudian pipet masing-masing 15 ml dan masukkan ke dalam botol dot lain yang sudah steril dan segera ditutup kembali.

# c. Penyimpanan pada suhu rendah

Penyimpanan ASIP pada suhu rendah dilakukan dalam *cooler bag* selama 8 jam. ASI di ditempatkan dalam botol dot yang terbuat dari bahan kaca.

Kemudian ASIP yang sudah dipersiapkan dalam dilakukan Uji Total Bakteri Metode Hitung Cawan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

# 1. Total Bakteri

Hasil analisa total bakteri menunjukkan terdapat bakteri pada ASIP sebelum penyimpanan, dan terjadi perubahan penurunan pada ASIP yang disimpan di *cooler bag* dan dipasteurisasi. Total bakteri pada ASIP fresh menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ASIP yang disimpan di cooler bag dan yang dipasteurisasi. ASIP termasuk salah satu bahan yang sangat mudah ditumbuhi bakteri karena komposisi gizi antara protein dan lemak yang cukup tinggi dan hal tersebut sangat menguntungkan untuk pertumbuhan mikroorganisme.

Perubahan total bakteri tersebut berkaitan dengan fase pertumbuhan mikro organisme. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan pertumbuhan mikroorganisme adalah ketersediaan nutrient, keasaman (pH), suhu dan kelembabab udara. Pada fase ini bakteri lebih banyak memerlukan energy dibanding dengan fase lainnya. (Fardiaz 1992 dalam penelitian Aminah dan Isworo, 2012)

Tabel 1. Deskripsi Total Bakteri ASIP berdasarkan Lama Penyimpanan (1 hari)

Responden	Tempat	Total
	penyimpanan	bakteri
Responden 1	Fresh	20,300
	Cooler bag	13,200
	Cooler bag	18,000
	pasteurisasi	
Responden 2	Fresh	9,500
	Cooler bag	13,200
	Cooler bag	3,000
	pasteurisasi	
Responden 3	Fresh	6,000
	Cooler bag	20,000
	Cooler bag	7,000
	pasteurisasi	
Responden 4	Fresh	20,400
	Cooler bag	8,500
1	Cooler bag	8,500
30	pasteurisasi	
Responden 5	Fresh	20,500
100	Cooler bag	16,200
- THE CO.	Cooler bag	24,000
1	pasteurisasi	
Responden 6	Fresh	20,400
1	Cooler bag	8,500
Sept.	Cooler bag	8,500
122 11	pasteurisasi	

# 2. Keasaman pH

Hasil analisa keasaman ASIP selama penyimpanan menunjukkan adanya perubahan yang berragam diantara ASI *fresh*, ASIP yang disimpan dalam *cooler bag* dan yang dipasteurisasi. Pada hari ke 0, ASIP *fresh* menunjukkan bahwa rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 7,1 sampai dengan 7,5 sedangkan pada hari ke 1, ASIP *fresh* menunjukkan bahwa rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 7,1 berkisar pada pH 7,1 sampai dengan 7,5 sedangkan pada hari ke 1, ASIP *fresh* menunjukkan bahwa rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH

5,5 sampai dengan 6,6. ASIP yang disimpan dalam cooler bag pada hari ke 0 rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,5 sampai dengan 5,9, sedangkan pada hari ke 1 rata – rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,9 sampai dengan 6,6. Sedangkan pada ASIP yang dipasteurisasi pada hari ke 0 ratarata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 7,1 sampai dengan sedangkan pada hari ke 1 rata - rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,9 sampai dengan 6,7. Perubahan keasaman ini dapat disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada ASIP Bakteri selama penyimpanan. tersebut mampu memetabolir laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan penurunan pH ASIP.

Menurut Murti (2014), bahwa pH susu ternak netral yakni antara 6,6 sampai dengan 6,8, kecuali susu unta dan ASIP 7,01. Pada pH sekitar ini mikroba khusus bakteri asam laktat mesofilik sangat cepat beradaptasi dan berkembang biak. Tabel 2. Deskripsi Keasaman (pH) ASIP berdasarkan Lama Penyimpanan

Responden	Tempat Penyimpanan	Lama penyimpanan	
	J P	0 hari	1 hari
Responden 1	Fresh	7,3	5,9
	Cooler bag	7,1	5,9
	Cooler bag pasteurisasi	7,4	5,9
Responden 2	Fresh	7,2	5,7
	Cooler bag	7.8	6,3
	Cooler bag pasteurisasi	7,6	6,7
Responden 3	Fresh	7,5	5,7
_	Cooler bag	7,8	6,7
	Cooler bag pasteurisasi	7,6	6,3
Responden 4	Fresh	7,1	6,6
	Cooler bag	7	6,6
	Cooler bag pasteurisasi	7,1	6,6
Responden 5	Fresh	7,5	5,5
Charles III	Cooler bag	7,4	5,9
2.50	Cooler bag pasteurisasi	7,4	6,1
Responden 6	Fresh	7,4	5,5
1000	Cooler bag	7,5	5,6
L P	Cooler bag pasteurisasi	7,7	6

ASIP mengandung laktosa yang tinggi sehingga menjadi media yang disukai oleh bakteri salah satunya bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang mampu memfermentasikan laktosa menjadi asam laktat. Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan penurunan pH ASIP menjadi 3 - 4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat, pada umumnya mikroorganisme dapat tumbuh pada pH 6-8. Penelitian Aminah dan Isworo (2012) menunjukkan bahwa keasaman pada ASI yang telah disimpan selama lima hari dengan suhu -5°C mengalami perubahan.

Perubahan keasaman ini dapat disebabkan oleh bakteri yang terdapat pada ASIP selama penyimpanan. Bakteri tersebut mampu memecah laktosa menjadi asam kondisi laktat. sehingga tersebut menyebabkan penurunan keasaman ASIP pada hari kelima. Penelitian juga pernah dilakukan oleh Siahaya, (2017) yang menunjukkan bahwa perlakuan lama waktu penyimpanan beku memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar protein, pH, jumlah total bakteri ASI yang disimpan selama dua belas hari pada freezer. Juga terdapat pengaruh penyimpanan pada almari pendingin (suhu 2-8°C) terhadap penurunan kadar laktosa dalam ASI (Arifin, dkk., 2009)

Perubahan keasaman (pH) dapat disebabkan oleh keberadaan bakteri yang terdapat pada ASIP selama penyimpanan. Murti (2014) mengemukakan bahwa pH susu ternak netral yakni antara 6,6-6,8, kecuali susu unta dan ASI 7,01. Pada pH sekitar ini mikroba khusus bakteri asam laktat mesofilik sangat cepat beradaptasi dan berkembang biak. Menurut Estiasih dan Ahmadi (2011) pada suhu pembekuan normal (-18°C), terjadi penurunan mutu yang lambat akibat perubahan kimiawi atau enzim. aktivitas Perubahan tersebut dipercepat dengan perubahan pH, peningkatan konsentrasi solute disekitar es, penurunan aktivitas air, dan potensi reduksi-oksidasi.Jika enzim tidak

diinaktivasi sebelum pembekuan, kerusakan membran sel menyebakan enzim kontak dengan solut dan bereaksi.

#### KESIMPULAN

- 1. Perlakuan lama waktu penyimpanan pembekuan lambat memberikan pengaruh yang nyata terhadap total bakteri yang terdapat dalam ASIP dengan hasil bahwa total bakteri pada ASIP fresh menunjukkan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan ASIP yang disimpan di cooler bag dan yang dipasteurisasi.
- Perlakuan lama waktu penyimpanan lambat pembekuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap keasaman ASIP dengan hasil bahwa hari ke 0, ASIP menunjukkan bahwa rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 7,1 sampai dengan 7,5 sedangkan pada hari ke 1, ASIP fresh menunjukkan bahwa ratarata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,5 sampai dengan 6,6. ASIP yang disimpan dalam cooler bag pada hari ke 0 rata-rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,5 sampai dengan 5,9, sedangkan pada hari ke 1 rata – rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,9 sampai dengan 6,6. Sedangkan pada ASIP yang dipasteurisasi pada hari ke 0 rata - rata kisaran pH ASIP berkisar pada pH 7,1 sampai dengan 7,7, sedangkan pada hari ke 1 rata – rata

- kisaran pH ASIP berkisar pada pH 5,9 sampai dengan 6,7.
- Terdapat pengaruh lama penyimpanan pada cooler bag terhadap total bakteri pada ASIP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S., S. Soetardjo., M. Soekarti., 2011. Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Aminah, S. dan J.T. Isworo. 2012. Pengaruh
  Penyimpanan Pada Suhu Rendah
  Terhadap Total bakteri dan keasaman
  dan Total Bakteri Air Susu Ibu.
  Prosiding Hasil Seminar Nasional.
  Lembaga Penelitian Universitas
  Muhammadiyah Semarang.
- Arimurti, Ida. 2007. Kebijakan Departemen Kesehatan tentang Peningkatan Pemberian ASI bagi Pekerja Wanita Indonesia.
- Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. 2012. Hak Ibu Menyusui di Indonesia. http://aimi-asi.org/Diakses tanggal 17 Juli 2012.
- Estiasih, T. dan K. Ahmadi. 2011. Teknologi Pengolahan Pangan. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Depkes RI. 2005. Manajemen Laktasi.
- \_\_\_\_\_. 2010. Kebijakan Peningkatan Pemberian ASI bagi Pekerja Wanita Indonesia

- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2015. Profil Kesehatan.
- Entjang, Indah. 2003. Mikrobiologi dan Parasitologi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fardiaz, Srikandi. 1992. Mikrobiologi Pangan 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fazriyati, Wardah. Jangan Asal Menyimpan ASIP, Ikuti Metodenya http://female.kompas.com/read/2010/09/03/1501441/jangan.asal.simpan.asi.perah.ikuti.metodenya Diakses pada 3 September 2010.
- Herawati H. 2008. Penentuan Total bakteri dan keasaman pada Produk Pangan.

  Jurnal Litbang Pertanian. Bogor:

  Kementrian Pertanian-Republik Indonesia.
- Khamzah, Siti Nur. 2012. Segudang Keajaiban ASIP yang Harus Anda Ketahui. Yogyakarta: Flashbooks.
- Karmas, Endel dan Robert S. Harris. 1989. Evaluasi Gizi pada Pengolahan Bahan Pangan. ITB, Bandung.
- Notoatmodjo. 2003. Ilmu Kesehatan Masyarakat prinsip-prinsip dasar. Jakarta: Rineka Cipta
- Muchtadi, T.R, Sugiyono, F.
  Ayustaningwarno. 2010. Ilmu
  Pengetahuan Bahan. Bandung :
  Penerbit Alfabeta.
- Murti, T. W., 2014. Pangan, Gizi dan Teknologi Susu. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

- Bersama Negara Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja
- Muchtadi, T,R, dan Sugiyono. 1992.
  Petunjuk Laboratorium Ilmu
  Pengetahuan Bahan Pangan. IPB,
  Bogor.
- Nurwantoro, Siregar, Abas, Djariyah. 1997. Mikrobiologi Pangan Hewani Nabati. Yogyakarta: Kanisius
- \_\_\_\_\_. 1993. Analisis
  Mikrobiologi Pangan. Jakarta: Raja
  Grafindo Persada.
- Proverawati, A. 2010. Kapita Selekta ASI dan Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika Purnama.
- Roesli, Utami. 2005. Mengenal ASI Eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya.

- Soetjiningsih. 1997. ASI Petunjuk untuk Tenaga Kesehatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Susenas. 2009. Presentasi Pemberian ASI Eksklusif 0-6 Bulan Menurut Provinsi Tahun 2009.
- Wahyuni, D. dan Novita K. 2013.
  Pelaksanaan Pemberian ASIP pada Ibu
  Pekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan
  dan Kesehatan Universitas
  Muhammadiyah Semarang.
  Semarang: Jurnal Kebidanan Vol.3,
  No.2 (2013)
- Wawan A dan Dewi . 2011. Pengetahuan, Sikap dan perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika
- Wulandari, A., Wulandari Meikawati dan Novita K. 2013. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Terhadap ASIP dengan Praktik Pemberian ASIP pada Ibu Bekerja di Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang. , 2014, Semarang: Jurnal Kebidanan Vol.2, no.2 (2013)

# Identifikasi Total Bakteri dan Keasaman Air Susu Ibu Perah (ASIP) yang disimpan di Cooler Bag

**ORIGINALITY REPORT** 

23% SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

**7**%

**PUBLICATIONS** 

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

6%

★ pusdatin.kemkes.go.id

Internet Source

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

Exclude matches

< 2%