

ABSTRACT

Pain is an unpleasant condition and is subjective. The pain can only be explained by the people experiencing in terms of scale and level. Pain can be controlled one of them with therapy nonpharmacological mentoring parents. Because of the presence of a parent can affect the child psychologically so that the child feel comfortable and calm when the procedure acts infusion. This implementation aims to determine the pain response of preschool children conducted mentoring parents when the infusion is done. In this implementation using a descriptive method. Methods of data collection used is the observation of facial expressions. Analysis of the data used is observing the pain of the child when the procedure of infusion. The results of the application obtained from 2 patients there is a change in a pain scale before and after the technique is carried out in guidance of parents, it can be concluded that non-pharmacological therapy assistance parents have the influence of pain response children pre-school at Home Roemani Muhammadiyah Semarang. This suggests that therapeutic mentoring the parent to reduce the pain response need to be applied as one of the nursing actions.

Keywords : Therapeutic accompaniment of the parents, the pain Response of pre-school children, the procedure of mounting the infusion

ABSTRAK

Nyeri merupakan kondisi tidak menyenangkan dan bersifat subjektif. Rasa nyeri hanya dapat dijelaskan oleh orang yang mengalami dalam hal skala maupun tingkatannya. Nyeri dapat dikontrol salah satunya dengan terapi nonfarmakologi pendampingan orangtua. Karena kehadiran orangtua dapat mempengaruhi psikologis anak sehingga anak merasa nyaman dan tenang saat dilakukan prosedur tindakan pemasangan infus. Penerapan ini bertujuan untuk mengetahui respon nyeri anak prasekolah yang dilakukan pendampingan orang tua saat pemasangan infus dilakukan. Dalam penerapan ini menggunakan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi ekspresi muka. Analisis data yang digunakan adalah mengamati nyeri anak saat dilakukan prosedur infus. Hasil penerapan yang diperoleh dari 2 pasien terdapat perubahan skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan teknik pendampingan orang tua, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi non farmakologi pendampingan orang tua memiliki pengaruh yang sangat baik terhadap respon nyeri anak pra sekolah di Rumah sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa terapi pendampingan orang tua untuk mengurangi respon nyeri perlu diterapkan sebagai salah satu tindakan keperawatan.

Kata kunci : Terapi pendampingan orang tua, Respon nyeri anak, Prosedur Pemasangan infus