

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fase pengobatan anak sebagian besar terdapat pada fase lanjutan yaitu sebanyak 64 anak (54,7%) dan fase awal sebanyak 53 anak (45,3%).
2. Status gizi anak penderita tuberkulosis mayoritas status gizi normal sebanyak 72 anak (61,5%), gizi kurang sebanyak 33 anak (28,2%), gizi buruk sebanyak 9 anak (7,7%) dan gizi lebih sebanyak 3 anak (2,6%).
3. Ada hubungan antara fase pengobatan dengan status gizi tuberkulosis anak (*p* - *value* 0,004).

B. SARAN

1. Bagi masyarakat
 - a. Diharapkan dalam menjalani pengobatan tuberkulosis secara rutin dan jangan sampai terputus.
 - b. Diharapkan untuk selalu memeriksakan status gizi anak.
 - c. Diharapkan dapat pemberian edukasi tentang gizi.
2. Bagi pihak Rumah Sakit
 - a. Diharapkan dapat menggambarkan manfaat pengobatan tuberkulosis secara paripurna terhadap status gizi anak.
 - b. Diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan dalam pengobatan tuberkulosis anak.

3. Bagi peneliti
 - a. Diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan metode pendekatan yang berbeda.

