

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG**

Skripsi, April 2017
Hendro

Hubungan Lama Kerja dengan Pengetahuan Perawat dalam Pencegahan Dekubitus di Ruang Intensif RS di Kota Semarang.

x + 40 Halaman + 6 Tabel + 2 Skema + 3 Gambar + 8 Lampiran

Abstrak

Dekubitus adalah kerusakan jaringan lunak di area tertentu yang disebabkan oleh stres mekanik berkelanjutan yang dapat merusak kulit dan jaringan yang ada dibawahnya. Dekubitus dapat mengakibatkan meningkatkan biaya, lama perawatan di rumah sakit serta memperlambat program rehabilitasi bagi penderita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara lama kerja dengan pengetahuan perawat dalam pencegahan dekubitus. Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional* yaitu tiap objek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek penelitian(lama kerja dengan pengetahuan perawat) yang diamati pada waktu yang sama di ruang intensif RSUD Kota Semarang. Rata-rata lama kerja perawat 107,36 bulan, Tingkat pengetahuan dengan kategori baik sebanyak 2 orang (7,1%), kategori cukup sebanyak 12 orang (42,9), dan kategori kurang sebanyak 14 orang (50,0). Hasil uji *spearman rho* didapatkan hasil *p-value* = 0,739 (< 0,05), yang berarti lama kerja tidak ada hubungan dengan tingkat pengetahuan seorang perawat. Diharapakan penelitian ini bisa menjadi dasar bahwa perawat diruang ICU dan HCU harus dibekali dengan pengetahuan tentang pencegahan dekubitus melalui pelatihan dan seminar.

Kata kunci : Lama Kerja, Pengetahuan, Pencegahan decubitus, dan ruang intensif.
Pustaka : 17 (2006 - 2011)

**UNDERGRADUATE NURSING STUDY PROGRAM
FACULTY OF NURSING AND HEALTH SCIENCES
UNIVERSITY MUHAMMADIYAH OF SEMARANG**

*Mini Thesis, April 2017
Hendro*

Length Relation of Work with Nurse Knowledge in Prevention of Dekubitus in Intensive Room of an RS in Semarang City.

x + 40 Page + 6 Table + 2 Scheme + 3 Image + 8 Attachments

Abstract

Decubitus is a soft tissue damage in certain areas caused by continuous mechanical stress that can damage the skin and tissues under it. Decubitus can lead to increased costs, length of hospitalization and delayed rehabilitation programs for patients. This study aims to determine whether there is a relationship between the length of work with the knowledge of nurses in prevention dekubitus. This research uses cross sectional approach that each research object is observed only once and the measurement is done on the character status or the research subject variable (length of work with nurse awareness) observed at the same time in the intensive room of RSUD Kota Semarang. The average length of nursing work is 107.36 months, knowledge level of good category is 2 people (7,1%), enough category is 12 people (42,9), and category less as many as 14 people (50,0). Spearman rho test results obtained p-value = 0.739 (<0.05), which means that the length of work has no relationship with the knowledge level of a nurse. It is hoped that this research could be the basis that the ICU and HCU room nurses should be equipped with the knowledge of prevention of decubitus through training and seminars.

*Keywords: Duration of Work, Knowledge, Prevention of decubitus, and intensive room.
Pustaka : 17 (2006 - 2011)*