

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- A.1. Hasil penelitian umur terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani adalah usia 51-60 tahun atau 28,07% dan rata-rata umur penderita adalah 59,2 tahun.
- A.2. Hasil penelitian jenis kelamin penderita gagal jantung terbanyak di Rumah Sakit Roemani adalah laki-laki sebanyak 32 orang atau 56,1%)
- A.3. Hasil penelitian etiologi gagal jantung terbanyak di Rumah Sakit Roemani adalah Penyakit jantung iskemik sebanyak 33 orang atau 57,9%.
- A.4. Rata-rata fraksi ejeksi keseluruhan 48,64, kelompok EF > 45% (64,41), kelompok EF < 45% (32,32).
- A.5. Hasil penelitian ventrikel kiri penderita gagal jantung terbanyak di Rumah Sakit Roemani adalah dilatasi 24 orang (42%).
- A.6. Hasil penelitian atrium kiri penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani dengan jumlah terbanyak adalah dilatasi 29 orang (51%).
- A.7. Hasil penelitian ventrikel kanan penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani dengan jumlah terbanyak adalah normal 50 orang (88%).
- A.8. Hasil penelitian atrium kanan terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani terbanyak adalah normal 48 orang (84%).
- A.9. Hasil penelitian katup mitral terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani adalah normal 46 orang (80,7%). Derajat regurgitasi mitral terbanyak *mild* (ringan) sebanyak 23 orang (40,4%)
- A.10. Hasil penelitian katup aorta terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani adalah normal 40 orang (70,2%). Derajat regurgitasi aorta terbanyak adalah normal 34 orang (59,6%).

- A.11. Hasil penelitian katup trikuspidal terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani adalah normal sebanyak 56 orang (98,2%). Derajat regurgitasi trikuspidal terbanyak adalah normal, 31 orang (54,4%).
- A.12. Hasil penelitian katup pulmonal terbanyak penderita gagal jantung di Rumah Sakit Roemani adalah normal sebanyak 56 orang (98,2%). Derajat regurgitasi pulmonal terbanyak adalah normal, 54 orang (94,7%).

B. Saran

- B.1. Perlu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar.
- B.2. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa etiologi penderita gagal jantung terbanyak adalah penyakit jantung iskemik, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor penyebab penyakit jantung iskemik.

