

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan satu antikoagulan dan dua antikoagulan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rata-rata nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan satu antikoagulan adalah 41.93 %.
- b. Rata-rata nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan dua antikoagulan adalah 40.00 %.
- c. Ada perbedaan hasil nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan satu antikoagulan dan dua antikoagulan.

B. Saran

1. Sebaiknya pemeriksaan hematokrit dilakukan menggunakan satu antikoagulan sesuai ketentuan karena penggunaan yang berlebih dapat mengalami penurunan nilai hematokrit.
2. Bagi tenaga analis adanya penelitian lebih lanjut tentang gambaran eritrosit untuk mengetahui apakah penurunan nilai hematokrit ini dikarenakan oleh kelebihan antikoagulan atau karena morfologi eritrosit yang mengkerut dengan pemeriksaan morfologi eritrosit menggunakan SADT.
3. Bagi tenaga analis adanya penelitian lebih lanjut tentang perbedaan nilai hematokrit yang diperiksa menggunakan antikoagulan EDTA dan antikoagulan Heparin.